

**ВІДМІНИ ВИДОВОГО СКЛАДУ ДЕННИХ МЕТЕЛИКІВ
(LEPIDOPTERA: PAPILIONOIDEA) ЛУЧНО-СТЕПОВИХ ОСЕЛИЩ
ГОЛОГОРО-ВОРОНЯКІВСЬКОГО ГОРБОГІР'Я ПІД ВПЛИВОМ
ПРИРОДНИХ І АНТРОПОГЕННИХ ФАКТОРІВ**

Канарський Ю. В.

Інститут екології Карпат НАН України

<https://park-podillya.com.ua/zbirnyk-do-200-richchia-didushyckoho>

Лучно-степові середовища існування досліджуваної території зазнали значних антропогенних змін протягом останніх 50-100 років. У сучасний час найбільш актуальними негативними факторами є спонтанне заліснення, інтенсивне сільськогосподарське використання прилеглих земель, ізоляція та фрагментація середовищ існування. Ці наслідки посилюються нещодавніми змінами клімату. Комплексна дія цих факторів призводить до загального зубожіння та втрати екологічної та біогеографічної унікальності біоти, зокрема видового складу метеликів.

Ключові слова: *біорізноманіття, зміни клімату, екологія, оселища, Північне Поділля, височини.*

The meadow-steppe habitats of the study area have undergone significant anthropogenic changes over the past 50-100 years. In modern times, the most relevant negative factors are spontaneous afforestation, intensive agricultural use of adjacent lands, isolation and fragmentation of the habitats. These impacts are exacerbated by recent climate changes. The complex action of these factors leads to a general impoverishment and loss of ecological and biogeographical uniqueness of the biota, in particular the species composition of butterflies.

Keywords: *biodiversity, climate changes, ecology, habitats, Northwest Podillya uplands.*

<https://doi.org/10.32718/npppp-conference.2025.10>