

АДВЕНТИВНИЙ ЕЛЕМЕНТ У ФЛОРИ ЗАПЛАВНОЇ ДЕРЕВНОЇ ТА ЧАГАРНИКОВОЇ РОСЛИННОСТІ БАСЕЙНУ ЗАХІДНОГО БУГУ

Борсукевич Л. М.^{1,2}

¹Ботанічний сад Львівського національного університету імені Івана Франка

²Інститут екології Карпат НАН України,

<https://park-podillya.com.ua/zbirnyk-do-200-richchia-didushyckoho>

У заплавної лісовій та чагарниковій рослинності басейну Західного Бугу нами було виявлено 51 чужорідний вид. Провідними родинami чужорідних рослин є Asteraceae (13 видів), Fabaceae (5 видів), Apiaceae та Lamiaceae (по 4 види). У біоморфологічному спектрі переважали гемікриптофіти. В екологічному спектрі домінували мезофіти, нейтрофіти, напівевтрофіти та нітрофіти. За часом прибуття переважають кенофіти, за ступенем натуралізації – епоєкофіти. З географічної точки зору переважають види північноамериканського, середземноморського та ірано-туранського походження.

Ключові слова: адвентивні види, басейн Західного Бугу, трансформація, біорізноманіття, заплавний ліс

We identified 51 alien species within the floodplain forest and shrub vegetation of the Western Bug basin. The leading families of the alien plants are Asteraceae (13 species), Fabaceae (5 species), Apiaceae and Lamiaceae (4 species each). In the biomorphological spectrum hemicryptophytes prevailed. The ecological spectrum dominated by mesophytes, neutrophytes, semieutrophytes and nitrophytes. According to the arrival time the kenophytes predominate, by the degree of naturalization – the epoeophytes. From geographical point of view the predominant species have North American, Mediterranean, and Irano-Turanian origin.

Keywords: adventive species, Western Bug basin, transformation, biodiversity, floodplain forest

<https://doi.org/10.32718/npppp-conference.2025.20>