

МАЙБУТНЄ ЛУЧНИХ СТЕПІВ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО ПОДІЛЛЯ – ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ МОНІТОРИНГУ ЗА 55 РОКІВ

Кагало О. О., Сичак Н. М., Андрєєва О. О., Скібіцька Н. В., Прокопчук А. В.

Інституту екології Карпат НАН України

<https://park-podillya.com.ua/zbirnyk-do-200-richchia-didushyckoho>

*Проаналізовано матеріали моніторингу стану лучно-степової рослинності Північного Поділля за останні 55 років. Зокрема, оцінено значення масштабного геоботанічного картування ключової ділянки Лиса Гора (Золочівський район, Львівська область), проведеного з інтервалом у 15 років. Зазначено, що спонтанне заліснення має катастрофічний негативний вплив на лучно-степову рослинність. Заліснення є наслідком створення лісових насаджень *Pinus sylvestris*, *P. nigra* та *P. banksiana*, яка в цих умовах фактично є інвазивним видом. Запропоновано заходи щодо оптимізації збереження цього типу екосистеми.*

Ключові слова: моніторинг, лучні степи, природоохоронний менеджмент, Північно-Західне Поділля

*The materials of monitoring the state of meadow-steppe vegetation of the Northern Podillia region over the past 55 years are analysed. In particular, the significance of large-scale geobotanical mapping of the key area of Lysa Hora (Zolochiv district, Lviv region), carried out with an interval of 15 years, is assessed. It is noted that spontaneous sylvatization has a catastrophic negative impact on meadow-steppe vegetation. Sylvatization is a consequence of the creation of *Pinus sylvestris*, *P. nigra* and *P. banksiana* forest plantations, which in these conditions is, in fact, an invasive species. Measures are proposed to optimize the preservation of this type of ecosystem.*

Keywords: monitoring, meadow steppes, environmental management, Northwestern Podillia

<https://doi.org/10.32718/npppp-conference.2025.23>